sans les bandes d'argent dont la couleur paraît éteinte, mais dont le dessin reste très apparent; tantôt au contraire les bandes d'argent sont très brillantes, avec un léger reflet rose. Il existe des exemplaires de transition entre ces deux formes.

La ♀ est, en dessus, d'une teinte fauve un peu obscure, mais très chaude. En dessous, le fond de ses ailes inférieures est or pâle, avec les dessins ordinaires vert doré.

La variété *dives* ne peut être confondue avec la variété *immaculata* (de Corse, de Provence et de Castille), dont les ailes, en dessus, ne sont pas aussi vivement colorées et dont les ailes inférieures, en dessous, ont le fond beaucoup plus uni. Chez *dives*, tous les dessins du dessous des ailes inférieures sont bien écrits sur un fond or pâle que je n'ai encore vu chez les *Paphia* d'aucune autre localité.

Ma collection contient 25 ♂ et 13 ♀ de la variété *dives*.

Description d'un genre nouveau et d'une espèce nouvelle d'Orthoptères de la côte occidentale de l'Afrique

par A. Finot.

Notre collègue M. le Dr Ph. François m'a communiqué un petit lot d'Orthoptères capturés par M. le capitaine Le Magnen, sur la côte occidentale de l'Afrique.

Ces Orthoptères sont :

Mantes.

Parathespis macra Stål; 1 ♂; Cligny, Casamance, 1900.

Othythespis senegalense Saussure; 1 ♀; Cligny, Casamance, 1900.

Oxyophthalmus Savatieri Rochebouet; 1 ♂; Cligny, Casamance, 1900.

Phasmes.

Clonaria gracilipes Westwood; non adulte; Cligny, Casamance, 1900.

Acridiens.

Truxalis carinulata Bolivar; 1 ♂; Grand Bassam, novembre 1906.

Thaleius, gen. nov. (de θάλειος, synonyme poétique de θαλερός, joyeux). — ♀. *Statura compacta. Facies* Calopteni. *Caput latum. Vertex*

convexus. Fastigium verticis pentagonum, declive, concavum, apice truncatum. Foveolae temporales triangulares, elongatae, a supero subconspicuae. Ocelli prope oculos siti. Oculi globosi, eminentes. Costa frontalis lata, concava, carinis lateralibus eminentibus clypeum non attingentibus. Carinae frontales sinuae. Antennae lineares, articulis longis. Pronotum disco subplano, trapezoidali, postice paulum latiori; carina media manifesta a sulcis duobus interrupta, a latere visa in prozona biundulata in metazona recta; sulco transverso typico ante medium sito, parve profundo, in dimidia parte superiori loborum deflexorum producto; alteris sulcis parum manifestis; margine antico recto: margine postico triangulari, apice rotundato; lobis deflexis subrectangularibus, altioribus quam longioribus, angulo postico late oblique truncato. Elytra apicem abdominis parum superantia, sublata, longitudine quintuplice latitudinis, dimidia parte basilari opaca cum reticulatione densa et irregulari, dimidia parte apicali semimembranacea cum reticulatione regulari, (notatione dignum : *dimidia pars basilaris areae discoidalis, inter venas radialem posticam et intercalatam, venulis transversis confertissimis et subparallelis, etiam in area ulnari); area mediastina (marginali) tertio basilari ampliata; vena intercalata areae discoidalis a venis radiali et ulnari aeque distante; vena axillari cum vena anali in tertio basilari elytri confluente. Alae modice amplae, elytris leviter breviores, margine postico subarcuato, infumata parte brevissimum vittam radialem submittente. Lobi mesosternales breves, valde distantes. Lobi metasternales valde distantes cum spatio inter foveolas valde breviori quam lato, rectangulari. Femora postica in parte basilari valde incrassata; a latere visa sensim apicem versus attenuata, ante genu angusta. Tibiae posticae rubrae, non annulatae, condylo nigro; supra in margine externo 10 spinosae, sine spina apicali, in margine externo 11 spinosae cum spina apicali; calcaribus sub-aequis.*

♂. *Ignotus.*

Ce genre, de la tribu des *Œdipodidae*, est voisin de *Thalpomena* Saussure; il en diffère par le vertex plus large; par le pronotum moins rétréci antérieurement et ayant sa carène médiane mieux marquée surtout sur la prozone, le bord postérieur a son apex moins aigu; par ses élytres ayant ses nervules de la moitié antérieure du champ discoïdal très serrées et parallèles; par les ailes n'émettant qu'un très faible prolongement huméral de la partie enfumée; par la coloration des ailes et des tibias postérieurs.

Ce genre a aussi un peu le faciès du genre *Caloptenus*, de la tribu des *Acrididae*, et quelque ressemblance partielle avec les Œdipodiens

des genres *Celes* Saussure, *Heteropternis* Stål, et *Bryodema* Fabr. Il convient de le placer à côté du genre *Thalpomena* Saussure.

Th. Lemagneni, sp. nov. — ♀. Long. corporis : 21 mill.; pronoti : 5 mill.; elytrorum : 20 mill.; antennarum : 7 mill.; femorum posticorum : 15 mill.

Corpus non rugosum, colore flavo-subfusco valde fusco-variegato. Fastigium verticis non carinatum. Pronoti pars postica nigra. Elytra subfusca, cum partibus subflavis; praesertim macula rectangulari subflava, prope dilatationem marginis antici sita, et macula subflava triangulari valde distincta ad tertiam partem apicalem elytri sita. Alarum basis sanguineo-rosea, colore acriore in parte radiata; alarum reliquum infumatum. Tibiae posticae rubrae, cum condylo nigro et parte vicina sub-flava, spinis apice late nigris. Tarsi postici longi, cum partibus subflavis vel subnigris. Valvulae oripositoris breves.

Afrique occidentale : Côte de l'Ivoire. — 1 ♀.

Cette espèce est dédiée à M. le capitaine Le Magnen (de l'infanterie coloniale), qui l'a capturée en 1900.

Zonoceras variegatus L.; 1 ♂, 1 ♀; (Bonaka Côte de l'Ivoire).

Locustaires.

Phaneroptera nana Charpentier; 1 ♀; Grand Bassam.

Sur la nomenclature de divers Insectes de l'Olivier

par P. Lesne.

En 1788, un excellent observateur, J.-E. Bernard, alors secrétaire perpétuel de l'Académie de Marseille, publiait dans le tome II de ses Mémoires pour servir à l'Histoire naturelle de la Provence [1] les diagnoses de plusieurs espèces d'Insectes vivant sur l'Olivier. Ces brèves descriptions, perdues dans un ouvrage d'un caractère purement agronomique, sont restées ignorées de la plupart des entomologistes. Elles n'avaient pas cependant échappé à nos savants confrères M. A. Fauvel

(1) Les observations consignées dans cet ouvrage avaient déjà été en partie publiées antérieurement par le même auteur dans le *Recueil de l'Académie des Belles-Lettres, Sciences et Arts de Marseille* du 25 août 1782 (Aix, 1783), p. 104-130; mais, dans ce premier travail, les Insectes dont il était question n'avaient pas reçu de noms dans le système linnéen.